


PROBLEMA 3B (AA PRECEDENTI)

Sono dati tre corpi con masse $m_1 = m_3 = m$, $m_2 = 2m$, con $m = 1400$ g come mostrato in figura. Il tratto orizzontale, sul quale poggiano i corpi 1 e 2, presenta un coefficiente di attrito dinamico $f_d = \sqrt{2}/9$. I corpi 1 e 2 sono collegati da una molla di costante elastica $k = 20$ N/m e lunghezza a riposo nulla, mentre i corpi 2 e 3 sono collegati da una fune inestensibile e di massa trascurabile. La parte del piano inclinato di un angolo $\alpha = 45^\circ$, non presenta alcun attrito. Sapendo che la lunghezza della molla è costante nel tempo, si chiede di determinare i seguenti:

1. il modulo dell'accelerazione a con cui si muovono tutti i corpi e la lunghezza della molla l .
2. Sapendo che al tempo $t = 0$ la velocità iniziale (in modulo) dei tre corpi è la stessa e vale $v_0 = 10$ cm/s, si trovi il lavoro compiuto dalle forze d'attrito, \mathcal{L}_a , al tempo $t = 2$ s.



Soluzione.

1. Prendendo come verso positivo quello per il quale il corpo 3 scende, applicando la seconda legge della dinamica a ciascuno dei 3 corpi e proiettando lungo la direzione del moto, si ottengono le corrispondenti 3 equazioni:

$$m a = k l - f_d m g \quad (1)$$

$$2 m a = -k l + T - 2 f_d m g \quad (2)$$

$$m a = -T + m g \sin \alpha \quad (3)$$

dove T indica la tensione della corda. Sommando membro a membro, le 3 equazioni si ottiene:

$$4 m a = (\sin \alpha - 3 f_d) m g \quad (4)$$

$$a = \frac{\sin \alpha - 3 f_d}{4} g = \frac{\sqrt{2}}{24} g = 0.578 \text{ m/s}^2 \quad (5)$$

dove, oltre al dato del problema, si è usato: $\sin \alpha = \cos \alpha = \sqrt{2}/2$.

Per trovare l , basta sostituire la (5) nella (1):

$$l = \frac{(\sin \alpha + f_d) m g}{4} \frac{m g}{k} = \frac{11}{72} \sqrt{2} \frac{m g}{k} = 14.84 \text{ cm} \quad (6)$$

2. Poichè si tratta di un moto uniformemente accelerato di cui è nota sia la velocità iniziale, v_0 che l'accelerazione a dal punto precedente, lo spazio percorso Δs vale:

$$\Delta s = v_0 (t - 0) + \frac{1}{2} a (t^2 - 0^2) = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 = 1.356 \text{ m} \quad (7)$$

Le forze di attrito sono costanti nel tempo, per cui sommando il contributo della forza agente sul corpo 1 (1) e quella sul corpo 2 (2), segue:

$$\mathcal{L}_a = -f_d m g \Delta s - 2 f_d m g \Delta s = -3 f_d m g \left(v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \right) = -8.78 \text{ J} \quad (8)$$