

Item	Sviluppo tipico	Sviluppo atipico
<p>Il b. resta in una posizione simmetrica da supino e mostra di rimanere agganciato allo stimolo proposto</p> <ul style="list-style-type: none"> • a 4 mesi non in modo coordinato • a 5 mesi in modo coordinato con gli arti 	<p>1 <input type="checkbox"/> si 2 <input type="checkbox"/> no</p>	<p>1 <input type="checkbox"/> si 2 <input type="checkbox"/> no</p>
<p>Il b. utilizza la posizione laterale come base stabile da un lato e con l'altro libero per esplorare</p> <ul style="list-style-type: none"> • a 4 mesi con il coinvolgimento della testa • a 5 mesi anche senza il coinvolgimento della testa 	<p>1 <input type="checkbox"/> si 2 <input type="checkbox"/> no</p>	<p>1 <input type="checkbox"/> si 2 <input type="checkbox"/> no</p>
<p>Il b. in posizione prona sfrutta la muscolatura delle gambe e del tronco per creare appoggio</p> <ul style="list-style-type: none"> • a 4 mesi segue con la testa un'oggetto • a 5 mesi associa il movimento della testa all'uso degli altri muscoli 	<p>1 <input type="checkbox"/> si 2 <input type="checkbox"/> no</p>	<p>1 <input type="checkbox"/> si 2 <input type="checkbox"/> no</p>
<p>Il b. dalla posizione supina a quella seduta sfrutta i muscoli del tronco e delle gambe coordinandosi anche la testa</p> <ul style="list-style-type: none"> • a 4 mesi rimane stabile se tirato in avanti • a 5 mesi rimane stabile con il tronco 	<p>1 <input type="checkbox"/> si 2 <input type="checkbox"/> no</p>	<p>1 <input type="checkbox"/> si 2 <input type="checkbox"/> no</p>
<p>Il b. nella posizione seduta supportata dall'adulto è in grado di esplorare l'ambiente mantenendo il bacino appoggiato ed il controllo della testa</p> <ul style="list-style-type: none"> • a 4 mesi ci riesce con entrambe le mani • a 5 mesi anche solo con una mano 	<p>1 <input type="checkbox"/> si 2 <input type="checkbox"/> no</p>	<p>1 <input type="checkbox"/> si 2 <input type="checkbox"/> no</p>
<p>Il b. in sospensione orizzontale è in grado di mantenere il tronco e il collo estesi</p> <ul style="list-style-type: none"> • a 4 mesi utilizza funzionalmente le braccia • a 5 mesi utilizza braccia e gambe 	<p>1 <input type="checkbox"/> si 2 <input type="checkbox"/> no</p>	<p>1 <input type="checkbox"/> si 2 <input type="checkbox"/> no</p>
<p>Il b. in posizione di sospensione verticale verso caduta in avanti aumenta la tonicità muscolare di gambe, tronco e collo</p> <ul style="list-style-type: none"> • a 4 mesi senza protezione con le braccia • a 5 mesi proteggendosi con le braccia 	<p>1 <input type="checkbox"/> si 2 <input type="checkbox"/> no</p>	<p>1 <input type="checkbox"/> si 2 <input type="checkbox"/> no</p>
<p>Il b. in posizione in piedi sostenuta dall'adulto è in grado di usare l'arco plantare come direzione e di mantenere la tonicità con il corpo</p> <ul style="list-style-type: none"> • a 4 mesi con le gambe tese • a 5 mesi anche con il movimento delle anche 	<p>1 <input type="checkbox"/> si 2 <input type="checkbox"/> no</p>	<p>1 <input type="checkbox"/> si 2 <input type="checkbox"/> no</p>

Chek-list adattata dalla Newborn Behavioral Observations system (NBO) di Nugent, J. K., Keefer, C., Minear, S., Johnson, L., Blanchard, Y. (2007)