

## Rischio di infezione congenita e danno fetale per epoca gestazionale di infezione materna

Età gestazionale (settimane)	Neonati infetti/neonati non infetti (rischio di infezione congenita , %)	Neonati sintomatici/ neonati infetti (%)
1-12	13/16 (81)	11/13 (85)
13-16	29/54 (54)	9/26 (35)
17-22	33/92 (36)	
23-30	19/63 (30)	
31-36	15/25 (60)	
> 36	8/8 (100)	

Tabella 1

## DETERMINAZIONE STATO IMMUNITARIO PER ROSOLIA PRE-GRAVIDANZA




Figura 1

## DETERMINAZIONE STATO IMMUNITARIO PER ROSOLIA IN GRAVIDANZA

Conservazione del campione per approfondimento diagnostico in  
Centri di Riferimento




Figura 2

## DIAGNOSI PRENATALE E NEONATALE DI INFEZIONE CONGENITA DA ROSOLIA





Figura 3

# FLOW CHART 1 DIAGNOSTICA ROSOLIA IN GRAVIDANZA

Proposta di Percorso Diagnostico presentato durante il  
XXXVII Congresso Nazionale AMCLI - Stresa, 5-8 ottobre 2008  
Aggiornato nel 2013

**≤ 12<sup>a</sup> SG**



**Legenda**

AV= avidità


SG.= settimana di gestazione

L.A = liquido amniotico

# FLOW CHART 2 DIAGNOSTICA ROSOLIA IN GRAVIDANZA

Proposta di Percorso Diagnostico presentato durante il  
XXXVII Congresso Nazionale AMCLI - Stresa, 5-8 ottobre 2008  
**Aggiornato nel 2013**

**> 12<sup>a</sup> SG**



**Legenda**

AV= avidità

SG= settimana di gestazione

L.A = liquido amniotico